

# Tumor Conjuntival: Evocador del Sida

\*Dr. GLADIMIR Pierre y Dr. JEAN CLAUDE Cadet

## EPIDEMIOLOGÍA DE LOS TUMORES CONJUNTIVALES

Durante el año 2011, 25,840 pacientes acudieron a la consulta de oftalmología del HUEH. Los tumores conjuntivales representaron el 10% de esas consultas. El pterigeon y la pingüecula ocupan un gran porcentaje, más del 90% de los tumores benignos.

Algunos de esos tumores conjuntivales que tienen un aspecto maligno a menudo nos sugieren la pista de la inmunodeficiencia en la mayoría de estos pacientes.

## CASO CLÍNICO

Paciente de 45 años es examinado en el servicio de oftalmología del Hospital Universitario Estatal de Haití por una masa en conjuntiva nasal de 2 a 3 meses de evolución, su agudeza visual es normal. Al examen en la lámpara de hendidura se le descubre una lesión conjuntival nasal sobre elevada de aspecto blanquecino, caseosa, que invade la córnea y progresa hasta el borde pupilar. Se mencionó el diagnóstico de carcinoma de células escamosas, se extirpa la totalidad de la masa para un estudio histológico para confirmar el diagnóstico. Se hizo serología para VIH que salió positiva.

En vista de la prevalencia del SIDA en Haití, algunas lesiones de la superficie externa del ojo nos hacen pensar en VIH; estos signos oculares son, en la mayoría de los casos reveladores del SIDA y van a permitir al paciente beneficiarse de un manejo global multidisciplinario.

## CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS

Este tumor se desarrolla a partir de la conjuntiva, se localiza a menudo a nivel del limbo, donde puede confundirse con pingüecula. 80 a 85% de los pacientes que presentan esta lesión son seropositivos, es muy invasora y se extiende rápidamente. Es más frecuente en África que en Europa y América del norte. Parece ser favorecida por los rayos ultravioletas del sol, que juega un papel de cofactor dentro de la transformación maligna de algunas infecciones virales conjuntivales como las que se asocian a VPH.

La excisión quirúrgica de la totalidad del tumor en su estadio inicial parece tener un buen pronóstico. La crioterapia, según a algunos autores, también da buenos resultados.

## CONCLUSIÓN

En Haití las lesiones de la superficie ocular externa son muy frecuentes en la consulta de oftalmología, sin embargo en todas esas lesiones conjuntivales vegetativas se debe descartar la inmunodeficiencia. ●

---

Artículo original en francés, traducido por la  
Dra. Audrey Juan